

GEBRAUCHSINFORMATION

BRONCHOSTOP® Hustentropfen

Z.Nr.: 15.515

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Kwizda Pharma GmbH, 1160 Wien

Zusammensetzung:

Die zuckerfreie Lösung enthält:

Guaifenesin	5,00 %
Evakulat Thymi comp. (mit Kamille)	25,00 %
Anisöl	0,05 %

Alkoholgehalt: ca. 15 Gew.%

weitere enthalten: Sorbit (0,3g in 20 Tropfen), Ethanol, Wasser gereinigt.

Eigenschaften und Wirksamkeit:

BRONCHOSTOP®-Hustentropfen zeichnen sich durch schleimlösende, auswurfördernde sowie hustenreizlindernde Wirkungen aus. Guaifenesin verflüssigt den zähen Bronchialschleim, wodurch das Abhusten erleichtert und der Hustenreiz gelindert wird. Zusätzlich wirkt Guaifenesin krampflösend auf die Bronchialmuskulatur.

Diese Wirkungen werden durch die Inhaltsstoffe von Thymian und Kamille noch unterstützt. Außerdem zeigt das im Evakulat Thymi comp. enthaltene Thymol auch antimikrobielle Effekte. Durch die entzündungshemmende Wirkung der Kamille wird die Heilung der gereizten Schleimhäute in Hals und Rachen gefördert.

Durch Anisöl erhalten BRONCHOSTOP® Hustentropfen einen charakteristischen aromatisch-süßlichen Geschmack.

BRONCHOSTOP®-Hustentropfen tragen zu einer erfolgreichen Behandlung des Hustens in Fällen akuter und chronischer Erkrankungen der Luftwege und der Atmungsorgane bei. Es kommt zu einer Erleichterung des Abhustens und zu einer raschen Linderung von quälendem Hustenreiz, die Heilungstendenz der entzündeten Gewebe wird verstärkt.

BRONCHOSTOP®-Hustentropfen sind zuckerfrei mit Sorbit zubereitet, daher auch für Diabetiker geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gegen Husten bei akuten und chronischen Erkrankungen der Luftwege und Atmungsorgane; schleimlösend, expektorationsfördernd, hustenreizlindernd; bei Raucherhusten.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen als Tropfen.

Dosierung:

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.

Erwachsene nehmen 3-5 mal täglich 20 Tropfen, Kinder entsprechend weniger.

(Ca. 20 Tropfen entsprechen 1 ml.)

Gegenanzeigen:

Gegenanzeigen sind Krankheiten oder Umstände, bei denen Sie ein Arzneimittel nicht oder nur nach ärztlicher Entscheidung anwenden dürfen.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile darf BRONCHOSTOP® nicht eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillperiode:

Aus Sicherheitsgründen sollte das Präparat während der ersten drei Schwangerschaftsmonate nicht eingenommen werden.

Da nicht bekannt ist, ob Guaifenesin in die Muttermilch übertritt, sollten Frauen, die BRONCHOSTOP® - Hustentropfen einnehmen, aus Sicherheitsgründen nicht stillen.

Nebenwirkungen:

Jedes Arzneimittel kann neben den erwünschten auch unerwünschte Wirkungen haben. Sie müssen jedoch nicht bei jedem Patienten auftreten.

BRONCHOSTOP®-Hustentropfen werden im allgemeinen sehr gut vertragen.

Bei mißbräuchlicher Verwendung können, wie auch bei anderen Arzneimitteln, in Einzelfällen Magen-Darm-Störungen und Überempfindlichkeitserscheinungen der Atemwege vorkommen.

Wechselwirkungen:

Bei der Einnahme zweier oder mehrerer Arzneimittel kann eine gegenseitige Beeinflussung im Sinne einer Verstärkung oder Abschwächung von Wirkung oder Nebenwirkung auftreten.

BRONCHOSTOP® kann bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, die Salicylate, Phenylbutazon oder Oxyphenbutazon enthalten, die magenreizende Wirkung dieser Mittel verstärken.

Die Einnahme von BRONCHOSTOP® sollte nicht gleichzeitig mit Alkohol oder Arzneimitteln erfolgen, die auf das Zentralnervensystem wirken.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Wechselwirkungen mit einem anderen Arzneimittel, das Sie einnehmen müssen, auftreten können, fragen Sie bitte vor Anwendung von BRONCHOSTOP® -Hustentropfen Ihren behandelnden Arzt.

Gewöhnungseffekte:

Sind nicht bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung:

Erste Anzeichen von Nebenwirkungen sind dem Arzt zu melden.

Dieses Arzneimittel enthält pro Dosis (20 Tropfen) ca. 0,17 g Alkohol (ca. 15 Gew.%) und darf daher alkoholkranken Personen nicht verabreicht werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Das in BRONCHOSTOP[®] enthaltene Guaifenesin kann die Ergebnisse von Laboruntersuchungen auf bestimmte Substanzen im Urin verfälschen.

Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Packungsgrößen:

20 ml, 50 ml, 100 ml

Lagerungshinweise:

Lichtschutz erforderlich.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.